

Odporúčané očkovanie detí, ktoré nie je hrazené zdravotnými poisťovňami (ZP) v roku 2025

ROČNÍK NARODENIA	ODPORÚČANÉ OČKOVANIE (NEHRADENÉ ZP)		
	VEK	DRUH OČKOVANIA	TYP OČKOVANIA
X	podľa zvoleného veku	tuberkulóza (TBC)	I. dávka
2025	vo veku 6 - 24 týždňov (Rotarix) vo veku 6 - 32 týždňov (Rotateq)	rotavírusové infekcie	2 až 3 dávky podľa zvolenej vakcíny*
X	skupina B - od 2 mesiacov alebo 10 rokov - podľa druhu vakcíny (Bexsero od 2 mes., Trumenba od 10 r.) skupiny A, C, W a Y (Nimenrix od 6 týždňov)	meningokokové infekcie	1 až 3 dávky a posilňovacia dávka podľa zvolenej vakcíny a podľa veku v čase podania prvej dávky**
X	od 1 roka	kliešťová encefalitída	I. dávka
			II. dávka
			III. dávka
			preočkovanie každé tri roky
2025 a staršie ročníky	od 1 roka	ovčie kiahne (varicella)	I. dávka
			II. dávka

Poznámky:

* Rotarix: Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov. Vakcinačné schéma sa má prednostne podať pred dosiahnutím veku 16 týždňov, ale musí sa ukončiť do veku 24 týždňov. Medzi dávkami má byť časový odstup najmenej 4 týždne.

* Rotateq: Očkovacia schéma pozostáva z 3 dávok. Prvá dávka sa môže podať vo veku od 6 týždňov, a nie neskôr ako vo veku 12 týždňov. Troj-dávková očkovacia schéma sa uprednostňuje ukončiť do veku 20 až 22 týždňov. Ak je to nevyhnutné, môže sa tretia (posledná) dávka podať do veku 32 týždňov. Medzi dávkami majú byť minimálne 4-týždňové intervaly.

**V súlade s SPC k jednotlivým vakcínam proti meningokokovej meningitíde.